

USG jamy brzusznej/układu moczowego dorośli i dzieci

USG jamy brzusznej dorośli

Na badanie USG należy zabrać ze sobą wyniki poprzednich badań USG, badań laboratoryjnych, karty informacyjne leczenia szpitalnego, jeśli mają związek z wykonywanym badaniem.

Dzień przed badaniem:

- zachować lekkostrawną dietę (należy unikać pokarmów wzdymających np. ciemnego pieczywa, surowych jarzyn i owoców oraz napojów gazowanych)
- zażyć 3 razy po 2 kapsułki Espumisan (usunięcie powietrza z przewodu pokarmowego; dostępny bez recepty)

Na 6 godzin przed badaniem:

- nie należy spożywać żadnych pokarmów
- nie należy przyjmować płynów słodzonych, gazowanych, kawy (można pić niegazowaną wodę mineralną/wodę przegotowaną)
- nie palić tytoniu, nie żuć gumy, nie spożywać środków odurzających

Na godzinę przed badaniem nie należy przyjmować żadnych płynów, wliczając wodę niegazowaną.

Na badanie USG układu moczowo-płciowego należy zgłosić się na czczo i z wypełnionym pęcherzem moczowym. Zaleca się wypicie około 1-1,5 litra niegazowanej wody na około godzinę przed badaniem.

USG jamy brzusznej dzieci

- **noworodki i niemowlęta:** badanie wykonuje się ok. 1-1.5 godz. po karmieniu. W przypadku oceny odźwiernika lub refluksu żołądkowo-przełykowego może być potrzeba dokarmienia dziecka. W tym celu należy zabrać ze sobą butelkę z mlekiem.
- **1- 5 rok życia** - badanie powinno być wykonane minimum 2 godziny od ostatniego posiłku.
- **powyżej 5 roku życia**- badanie powinno być wykonane minimum 4 godziny od ostatniego posiłku,
- dzieci z tendencją do wzdęć, powinny przyjąć, Espumisan (według zaleceń lekarza).

Badanie trwa ok. 15 minut.

